

148 mm

10 mm

128 mm

10 mm

10 mm

KiObind® forma nello stomaco una sostanza gelatinosa che si mescola al cibo. Durante questo processo i grassi contenuti negli alimenti vengono catturati e legati in forma insolubile. I lipidi così catturati non vengono assorbiti e non entrano in circolo, ma vengono eliminati senza essere digeriti.

In più, la vitamina C favorisce una più rapida solubilizzazione del chitosano nello stomaco.

XL-S Medical Booster si lega unicamente ai lipidi, ma non ai carboidrati o agli zuccheri.

IMPIEGO

XL-S Medical Booster è destinato agli adulti sovrappeso e obesi (Indice di Massa Corporea ≥ 25) e per uso orale.

Posologia raccomandata per la perdita di peso:

- 2 compresse tre volte al giorno
- Assumere poco prima del pasto principale accompagnate da un grande bicchiere d'acqua o altro liquido.

Posologia consigliata per il controllo del peso:

- 1 compressa tre volte al giorno
- Assumere poco prima del pasto principale accompagnata da un grande bicchiere d'acqua o altro liquido.



Le compresse non vanno masticate né rotte coi denti! In linea di principio si consiglia di bere ogni giorno almeno due litri d'acqua o di altra bevanda non dolcificata.

XL-S Medical Booster può essere assunto per un periodo di tempo prolungato. La durata consigliata del trattamento è di 12 settimane.

Non superare la posologia giornaliera consigliata. Il sovradosaggio di XL-S Medical Booster non aumenta l'efficacia del prodotto, ma può favorire l'insorgere di effetti collaterali.

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Senza esaltatori di sapidità, senza conservanti.
- Privo di lattosio, iodio, glutine e colesterolo.
- Adatto per diabetici (senza incidenza sulle unità glucidiche). Tuttavia, le persone diabetiche dovrebbero consultare il loro medico prima dell'impiego.
- XL-S Medical Booster viene prodotto con ingredienti naturali e non contiene materie prime di origine animale. Piccole variazioni di colore e di gusto non incidono sull'efficacia del prodotto.
- Un senso di sazietà transitorio può svilupparsi dopo l'assunzione del XL-S Medical Booster.

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE E PERDITA DI PESO

Alimenti con un elevato contenuto di grassi come carni, salumi o formaggi grassi, alimenti fast food o snack ricchi di lipidi sono spesso causa di sovrappeso.

Poiché i grassi sono particolarmente energetici, spesso questi alimenti forniscono all'organismo più calorie del necessario. L'energia in eccesso viene così immagazzinata dall'organismo sotto forma di depositi di grasso.

Un'alimentazione consapevole si traduce in un apporto moderato di grassi e carboidrati, ma sufficiente di vitamine e minerali. Inoltre, l'attività fisica aumenta il consumo di calorie e aiuta a smaltire i depositi di grasso.

Per coprire il fabbisogno giornaliero di vitamine liposolubili A, D, E e K e di acidi grassi essenziali, dovete assumere tali sostanze in quantità sufficiente al di fuori dei pasti principali. Se ne-

cessario, un prodotto multivitaminico può aiutare a coprire il fabbisogno vitaminico dell'organismo.

EFFETTI COLLATERALI

- Raramente, un'ipersensibilità a uno o più dei componenti può accadere.
- Se si assume una dose eccessiva di prodotto o una quantità di liquido insufficiente, può insorgere stitichezza.
- Occasionalmente possono presentarsi disturbi gastrointestinali quali costipazione, dispepsia, mal di stomaco, flatulenze, disturbi o dolori addominali, nausea, vomito o diarrea.

Se questi effetti collaterali persistono, occorre ridurre la dose o sospendere l'assunzione del prodotto e, se necessario, chiedere consiglio a un professionista della sanità.

INTERAZIONI


L'elevata capacità di legame coi grassi di XL-S Medical Booster influisce anche sull'assorbimento delle vitamine liposolubili e dei principi attivi dei medicinali, come per esempio gli ormoni contenuti nella pillola anticoncezionale o nei preparati contro i disturbi della menopausa. Per non compromettere l'efficacia di questi medicinali, occorre lasciar passare un intervallo di almeno quattro ore tra l'assunzione di XL-S Medical Booster e l'assunzione dei medicinali o dei prodotti vitaminici.

CONTROINDICAZIONI

- Non deve assumere XL-S Medical Booster in caso di allergia nota nei confronti di uno dei componenti.
- Non deve assumere XL-S Medical Booster se soffre di una malattia infiammatoria del tratto digerente come l'esofagite da reflusso (bruciore di stomaco), la gastrite, le ulcere gastriche o intestinali (p. es. al duodeno), il morbo di Crohn, la colite ulcerosa o la diverticolite, oppure se presenta sintomi di occlusione intestinale (occlusione meccanica o da paralisi intestinale sospetta o accertata), paralisi gastrica in presenza di neuropatia diabetica, polipi intestinali o gravi disturbi digestivi.
- Non assumere XL-S Medical Booster nel caso di un'anamnesi di costipazione.
- Non assumere XL-S Medical Booster in caso di sottopeso (Indice di Massa Corporea [IMC] $< 18,5$).
- XL-S Medical Booster non dev'essere assunto in gravidanza e durante l'allattamento, per non compromettere l'apporto di importanti sostanze nutritive al feto o al lattante.
- Gli adolescenti possono assumere XL-S Medical Booster solo dopo aver consultato un medico.
- Non è indicato per lattanti e bambini piccoli.
- In caso di dubbio, chiedere consiglio al proprio medico o farmacista.

AVVERTENZE

- Non masticare le compresse. Non lasciar sciogliere le compresse in bocca.
- Se alla prima apertura della confezione i blister appaiono già danneggiati o aperti, non utilizzare il prodotto.
- Non usare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Dispositivo medico  0481

Fabbricante:
KitoZyme SA
Parc Industriel des
Hauts Sarts Zone 2
Rue de Milmort, 680
4040 Herstal - Belgio

Distribuzione:
Interdelta SA
Route André-Piller 21
1762 Givisiez
Svizzera

Ultima revisione: giugno 2017

XL-SBOOSTER_2017_06_06

XL-S MEDICAL Fettbinder

Booster

KiObind®

GEBRAUCHSINFORMATION

XL-S Medical Booster ist ein nach den Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG zertifiziertes Medizinprodukt.

Bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage vor dem Gebrauch des Produktes sorgfältig durch.

Damit die XL-S Medical Booster Tabletten ihre Wirkung ordnungsgemäss entfalten können, müssen sie gemäss den Anweisungen eingenommen werden.

VERWENDUNGSZWECK

XL-S Medical Booster ist indiziert zur Unterstützung der Gewichtsabnahme oder zur Gewichtskontrolle bei der Behandlung und der Vorbeugung von Übergewicht und Adipositas, um damit verbundene Krankheiten zu vermeiden.

XL-S Medical Booster wirkt, indem es die Absorption von Fetten aus der Nahrung begrenzt. Infolgedessen wird die Kalorienzufuhr verringert, was zur Wiederherstellung einer gesunden Energiebilanz beiträgt und das Programm zur Gewichtskontrolle unterstützt.

PACKUNG UND ZUSAMMENSETZUNG

Packung mit 180 Tabletten.

Wirkstoff: 1 Tablette XL-S Medical Booster enthält 544 mg KiObind®. XL-S Medical Booster basiert auf der KiObind®-Technologie, einer Kombination von KiOnutrim-CsG® (nicht-tierisches Chitosan), das vom Mycel des Aspergillus niger und Vitamin C gebildet wird.

Weitere Inhaltsstoffe: mikrokristalline Cellulose, Hypromellose (HPMC), Croscarmellose-Natrium, wasserfreies kolloidales Siliziumdioxid, Titandioxid, Talkum, Magnesiumstearat und Stearinsäure.

WIE WIRKT XL-S Medical Booster?

Die Verbindung von KiOnutrim-CsG® mit dem in XL-S Medical Booster enthaltenen Vitamin C sorgt für eine optimierte Wirksamkeit von Chitosan.

Die Fähigkeit des Vitamins C, physikalische und mechanische Eigenschaften des Chitosan-Gels im Magen-Darm-Trakt zu verändern, verbessert sein Fettbindungsvermögen (höhere Ölspeicherfähigkeit und vermindertes Austreten von eingeschlossenem Fett).

So bildet KiObind® eine gelartige Substanz im Magen, welche sich mit der Nahrung vermischt. In diesem Prozess werden die Nahrungsfette teilweise aus der Nahrung gezogen und in nicht löslicher Form gebunden. Die gebundenen Fette gelangen nicht in den Blutkreislauf, sondern werden unverdaut ausgeschieden.

Darüber hinaus fördert Vitamin C eine schnellere Auflösung von Chitosan im Magen.

XL-S Medical Booster bindet nur Fette, keine Kohlenhydrate oder Zucker.

ANWENDUNG

XL-S Medical Booster ist für Erwachsene mit Übergewicht oder Adipositas (Body-Mass-Index ≥ 25) und zur oralen Anwendung bestimmt.

Empfohlene Dosierung zur Gewichtsabnahme:

- dreimal täglich 2 Tabletten
- vor jeder Hauptmahlzeit mit einem grossen Glas Flüssigkeit einnehmen.

Empfohlene Dosierung zur Gewichtskontrolle:

- dreimal täglich 1 Tablette
- vor jeder Hauptmahlzeit mit einem grossen Glas Flüssigkeit einnehmen.



Tabletten nicht kauen oder zerbeißen! Grundsätzlich wird empfohlen, täglich mindestens zwei Liter Wasser oder unge-süsste Flüssigkeiten zu trinken.

XL-S Medical Booster kann über einen langen Zeitraum eingenommen werden. Die empfohlene Behandlungsdauer beträgt 12 Wochen.

Überschreiten Sie die empfohlene Tagesdosis nicht. Eine Überdosierung von XL-S Medical Booster erhöht die Wirkung des Produkts nicht und kann eventuelle Nebenwirkungen begünstigen.

WEITERE INFORMATIONEN

- Ohne Geschmacksverstärker, ohne Konservierungsmittel.
- Laktose-, jod-, gluten- und cholesterinfrei.
- Für Diabetiker geeignet (ohne Einfluss auf die Broteinheiten). Dennoch sollten Diabetiker vor der Anwendung von XL-S Medical Booster ihren Arzt um Rat fragen.
- XL-S Medical Booster wird aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt und enthält keine Ausgangsstoffe tierischen Ursprungs. Leichte Abweichungen in Farbe und Geschmack haben keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit des Produkts.
- Nach der Einnahme von XL-S Medical Booster kann ein vorübergehendes Sättigungsgefühl auftreten.

BEWUSSTE ERNÄHRUNG UND GEWICHTSABNAHME

Lebensmittel mit hohem Fettgehalt wie fettreiche Fleisch-, Wurst- oder Käseprodukte, Fast-Food oder fettreiche Snacks sind häufig die Ursache für Übergewicht.

Da Fette besonders energiereich sind, versorgen diese Lebensmittel den Körper oft mit mehr Kalorien als eigentlich nötig. Die überschüssige Energie wird in Fettpolstern im Körper gespeichert.

Eine bewusste Ernährung bedeutet eine mässige Zufuhr von Fetten und Kohlenhydraten, aber ausreichend Vitamine und Mineralstoffe. Körperliche Aktivität erhöht ausserdem den Kalorienverbrauch und hilft, Fettpolster abzubauen.

Um den täglichen Bedarf an den fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K sowie an essentiellen Fettsäuren zu decken, sollten Sie neben den Mahlzeiten Ihren Bedarf an fettlöslichen Vitaminen und essentiellen Fettsäuren abdecken. Wenn nötig kann ein Multivitaminprodukt helfen, den Vitaminbedarf zu decken.

NEBENWIRKUNGEN

- In seltenen Fällen kann es zu einer Überempfindlichkeit gegenüber einem oder mehreren Inhaltsstoffen kommen.
- Bei Überdosierung oder wenn das Produkt nicht mit ausreichend Flüssigkeit eingenommen wird, kann es zu Verstopfung kommen.
- Magen-Darm-Beschwerden wie Verstopfung, Verdauungsstörungen, Magenschmerzen, Blähungen, Winde, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall können gelegentlich auftreten.

Sollten die Nebenwirkungen anhalten, ist die Dosis zu reduzieren oder das Produkt abzusetzen und gegebenenfalls eine medizinische Fachperson aufzusuchen.

WECHSELWIRKUNGEN

Die hohe Fettbindekapazität von XL-S Medical Booster beeinflusst auch fettlösliche Vitamine und Wirkstoffe von Arzneimitteln, wie beispielsweise die Hormone in der Anti-Baby-Pille oder in hormonhaltigen Präparaten zur Behandlung

180 mm

10 mm

10 mm

44 mm

44 mm

de Beschwerden während der Menopause. Um die Wirksamkeit dieser Medikamente nicht zu beeinträchtigen, sollten Sie zwischen der Einnahme von XL-S Medical Booster und der Einnahme von Medikamenten oder Vitaminprodukten mindestens vier Stunden warten.

KONTRAINDIKATIONEN

- Nehmen Sie XL-S Medical Booster nicht ein bei bekannter Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe.
- Nehmen Sie XL-S Medical Booster nicht ein, wenn Sie an einer entzündlichen Krankheit des Verdauungstrakts wie Refluxösophagitis (Sodbrennen), Gastritis, Magen- oder Darmgeschwüren (z.B. am Zwölffingerdarm), Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder Divertikulitis leiden oder Anzeichen von Darmverschluss (drohender oder bestehender mechanischer oder paralytischer Darmverschluss), Magenlähmung bei diabetischer Neuropathie, Darmpolyopen oder bestehenden schweren Verdauungsstörungen haben.
- Nehmen Sie XL-S Medical Booster nicht ein, wenn Sie in der Vergangenheit unter Verstopfung litten.
- Nicht bei Untergewicht (Body-Mass-Index (BMI) < 18,5) anwenden.
- XL-S Medical Booster darf nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit eingenommen werden, um die Zufuhr wichtiger Nährstoffe für den Embryo bzw. den Säugling nicht zu beeinträchtigen.
- Jugendliche sollten XL-S Medical Booster nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden.
- Nicht für Säuglinge oder Kinder geeignet.
- Im Zweifelsfall fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

WARNHINWEISE

- Tabletten nicht kauen. Tabletten nicht im Mund zergehen lassen.
- Blister, die vor der ersten Einnahme in der Schachtel schon beschädigt oder aufgebrochen sind, nicht verwenden.
- Nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum, darf das Produkt nicht mehr angewendet werden.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- An einem trockenen Ort bei Raumtemperatur aufbewahren.

Medizinprodukt  0481

Hersteller:
KitoZyme SA
Parc Industriel des
Hauts Sarts Zone 2
Rue de Millmort, 680
4040 Herstal – Belgien

Vertrieb:
Interdelta SA
Route André-Piller 21
1762 Givisiez
Schweiz

Stand der Informationen: Juni 2017

XL-S MEDICAL **Captur de graisses** Booster KiObind®

INFORMATIONS DESTINÉES AUX PATIENTS

XL-S Medical Booster est un dispositif médical certifié conformément aux dispositions de la directive 93/42/CEE.

Veuillez lire attentivement et intégralement les consignes d'utilisation ci-jointes. Les comprimés XL-S Medical Booster produisent l'effet escompté uniquement si elles sont prises conformément aux consignes.

OBJECTIF D'UTILISATION

XL-S Medical Booster est indiqué en soutien à la perte de poids ou au contrôle du poids lors du traitement et de la prévention du surpoids et de l'obésité dans le but de prévenir les pathologies associées à ces états de santé.

XL-S Medical Booster agit en réduisant l'absorption des graisses alimentaires. En conséquence, l'apport calorique est diminué aidant ainsi à retrouver une balance énergétique saine et à soutenir un programme de gestion du poids.

EMBALLAGES ET COMPOSITION

Emballage de 180 comprimés.

Ingrédient principal: 1 comprimé de XL-S Medical Booster contient 544 mg de KiObind®. XL-S Medical Booster est basé sur la technologie KiObind®, qui est une combinaison de KiOnutrime-CsG® (chitosane non animale) provenant de mycélium d'Aspergillus niger et de la vitamine C.

Autres composants: cellulose microcristalline, hypromellose (HPMC), croscarmellose sodique, silice colloïdale anhydre, dioxyde de titane, talc, stéarate de magnésium et acide stéarique.

COMMENT AGIT XL-S Medical Booster ?

La combinaison du KiOnutrime-CsG® et de la vitamine C contenue dans XL-S Medical Booster permet d'optimiser l'activité du chitosane.

En effet, la capacité de la vitamine C à modifier certaines propriétés physiques et mécaniques du gel de chitosane dans le tractus gastro-intestinal améliore ses performances de liaison aux graisses (augmentation de la capacité de retenue d'huile et diminution de la fuite des graisses piégées).

Ainsi, le KiObind® forme dans l'estomac une sorte de gel qui se mélange aux aliments. Lors de ce processus, les graisses sont partiellement isolées des aliments et liées sous une forme insoluble. Ces graisses liées ne pénètrent pas dans la circulation sanguine et sont excrétées sans être digérées.

De plus, la vitamine C favorise une solubilisation plus rapide du chitosane dans l'estomac.

XL-S Medical Booster ne lie que les lipides, et pas les hydrates de carbone et les sucres.

UTILISATION

XL-S Medical Booster est destiné aux adultes en surpoids ou obèses (Indice de Masse Corporelle ≥ 25) et à un usage oral.

Posologie recommandée pour la perte de poids :

- **2 comprimés trois fois par jour**
- A prendre juste avant chaque repas principal avec un grand verre de liquide.

Posologie recommandée pour le contrôle du poids :

- **1 comprimés trois fois par jour**
- A prendre juste avant chaque repas principal avec un grand verre de liquide.



Ne pas mâcher ou croquer les comprimés! En principe, il est recommandé de boire au moins deux litres d'eau ou de liquide non sucré par jour.

XL-S Medical Booster peut être pris sur une longue période. La durée recommandée du traitement est de 12 semaines.

Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Un surdosage de XL-S Medical Booster n'augmente pas l'effet du produit et peut éventuellement provoquer des effets secondaires.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Sans exhausteur de goût ni conservateur.
- Sans lactose, iode, gluten ni cholestérol.

- Convient aux personnes diabétiques (sans incidence sur les unités glucidiques). Cependant, les personnes diabétiques devraient demander conseil à leur médecin avant son utilisation.
- XL-S Medical Booster est produit à partir d'ingrédients naturels et ne contient pas de matière première d'origine animale. Les légères variations de couleur et de goût n'ont aucune influence sur l'efficacité du produit.
- Une sensation de satiété transitoire peut survenir après la prise de XL-S Medical Booster.

ALIMENTATION SAINTE ET PERTE DE POIDS

Le surpoids est fréquemment causé par une consommation excessive d'aliments gras, tels que les viandes grasses, les saucisses, les fromages, le fast-food ou les en-cas à forte teneur en graisse.

Les graisses étant particulièrement caloriques, ces aliments apportent souvent davantage de calories que ce dont le corps a besoin. L'énergie excédentaire est alors stockée sous forme de tissus adipeux.

Une alimentation saine implique une consommation modérée de graisses et de glucides, associée à une prise suffisante de vitamines et de sels minéraux. De plus, l'activité physique augmente la consommation des calories et permet de réduire les tissus adipeux.

Afin de couvrir les besoins quotidiens en vitamines A, D, E et K liposolubles et en acides gras essentiels, vous devez veiller à satisfaire hors des repas vos besoins en vitamines liposolubles et acides gras essentiels. Le cas échéant, un produit multivitaminé peut vous aider à couvrir vos besoins en vitamines.

EFFETS SECONDAIRES

- Rarement, une hypersensibilité à l'un ou plusieurs des composants peut se produire.
- Un surdosage ou la prise du produit avec une quantité insuffisante de liquide peut entraîner une constipation.
- Des troubles gastro-intestinaux tels que constipation, dyspepsie, maux d'estomac, ballonnements, flatulences, douleur ou inconfort abdominaux, nausées, vomissements ou diarrhées peuvent occasionnellement survenir.

Si les effets secondaires persistent, il convient de réduire la dose voire d'interrompre la prise du produit et le cas échéant de demander conseil à un professionnel de santé.

INTERACTIONS

La grande capacité de XL-S Medical Booster à lier les lipides a également un impact sur les vitamines liposolubles et les principes actifs de médicaments, comme par exemple les hormones contenues dans les pilules contraceptives ou les préparations utilisées dans le traitement de troubles liés à la ménopause. Afin de ne pas compromettre l'efficacité de ces médicaments, leur prise ou la prise de vitamines et celle de XL-S Medical Booster doivent être espacées d'au moins quatre heures.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne prenez pas XL-S Medical Booster en cas d'allergies connues à l'un des composants.
- Ne prenez pas XL-S Medical Booster si vous souffrez de maladies inflammatoires du tube digestif comme par exemple oesophagite de reflux (brûlures d'estomac), gastrite, ulcère de l'estomac ou intestinal (p. ex. duodénal), maladie de Crohn, colite ulcéreuse, diverticulite, de signes d'occlusion intestinale (paralytique ou mécanique existante ou potentielle), gastroparésie en cas de neuropathie diabétique, polypes intestinaux et troubles digestifs graves.
- Ne prenez pas XL-S Medical Booster si vous avez un historique médical lié à la constipation.
- Ne pas prendre XL-S Medical Booster en cas de poids insuffisant (Indice de Masse Corporelle (IMC) < 18,5).
- XL-S Medical Booster ne doit pas être pris pendant la grossesse et l'allaitement afin de ne pas compromettre l'apport en nutriments essentiels à l'embryon ou au nourrisson.
- Les adolescents ne doivent prendre XL-S Medical Booster qu'après avoir consulté un médecin.

- Ne convient pas aux nourrissons ni aux enfants.
- En cas de doute, demandez conseil à un professionnel de santé.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas croquer les comprimés. Les comprimés ne doivent pas se dissoudre dans la bouche.
- Ne pas prendre les comprimés d'un blister déjà abimé ou ouvert dans la boîte avant la première prise.
- Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.
- A conserver hors de portée des enfants.
- A conserver dans un endroit sec et à température ambiante.

Dispositif médical  0481

Fabricant:
KitoZyme SA
Parc Industriel des
Hauts Sarts Zone 2
Rue de Millmort, 680
4040 Herstal – Belgique

Distribution:
Interdelta SA
Route André-Piller 21
1762 Givisiez
Suisse

Dernière révision: juin 2017

XL-S MEDICAL **Cattura grassi** Booster KiObind®

INFORMAZIONI PER L'USO

XL-S Medical Booster è un dispositivo medico certificato in conformità con le disposizioni della direttiva 93/42/CEE.

Leggere attentamente il foglietto illustrativo prima dell'uso.

Affinché le compresse di XL-S Medical Booster possano sviluppare correttamente la propria efficacia, devono essere assunte secondo le istruzioni.

FINALITÀ D'IMPIEGO

XL-S Medical Booster è indicato come supporto nella perdita di peso o nel controllo del peso durante il trattamento e la prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, con lo scopo di prevenire le patologie associate a questo stato di salute.

XL-S Medical Booster agisce riducendo l'assorbimento dei grassi alimentari. Di conseguenza, l'apporto calorico viene diminuito, aiutando così a ritrovare un bilancio energetico sano e sostenere un programma di gestione del peso.

CONFEZIONE E COMPOSIZIONE

Confezione da 180 compresse.

Componente principale: 1 compressa di XL-S Medical Booster contiene 544 mg di KiObind®. XL-S Medical Booster si basa sulla tecnologia KiObind®, che è una combinazione di KiOnutrime-CsG® (chitosano non animale), derivato dal micelio dell'Aspergillus niger, e di vitamina C.

Altri componenti: cellulosa microcristallina, ipromellosa (HPMC), croscarmellosa sodica, silice colloïdale anidra, biossido di titanio, talco, magnesio stearato, acido stearico.

COME AGISCE XL-S Medical Booster?

XL-S Medical combina KiOnutrime-CsG® e vitamina C, permettendo un'ottimizzazione dell'attività del chitosano.

In effetti, la capacità della vitamina C di modificare alcune proprietà fisiche e meccaniche del gel di chitosano nel tratto gastro-intestinale migliora le sue capacità di legare i grassi (aumento della capacità di trattenere l'olio e diminuzione della dispersione del grasso intrappolato).